

新種妙義唐松

前川 文 夫

F. MAEKAWA: A new Species of *Thalictrum* from Japan.

傑レタ郷土ハ傑出シタモノヲ持ツト云フ。上毛ノ名山妙義山ニモ亦隠レターツノ珍奇ナ種類ガアツタ。ソレハからまつさう屬ノ一種デアツテ、高サハ40cm.カラ大キナ株ハ1m. ニモ達シ全草霜ヲ置イタ様ニ白ク、殊ニ葉ノ裏面ニ到ツテハ全ク乳白色デ中々ニ美シイ姿デアツテ、萬草中ノ一雄タルヲ失ハナイ。類縁カラ云ツテあきからまつ (*Thalictrum Thunbergii* DC) ニ近い所ガアルガ、ソレトハ比較ニナラス程白ク、葉ノ裏ニハルーベデ見ルト一種獨特ノ突起ヲ一面ニ布イテ居ルノデハツキリ區別ガ出來ル。又こからまつ (*Thalictrum yessoense* NAKAI) ガ北地ニ産シヤ、似テ居ルガ、ソレハ莖ハ低クテ 20-30 cm. デ葉ノ小葉ハ甚ダ細カク、ソノ上、裏面ノ葉脈ガ打込ミニ成ツテ居ルノデ大分遠縁ノモノデアアル。昭和四年ノ夏晩ク、久内清孝氏ガコノ珍品ヲ始メテ見出ダサレテソノ標本ガ中井先生ノモトニ致サレ、コハニ産地ニ因ンデ妙義からまつノ和名ト眞白イ葉ニ基イテ

*Thalictrum chionophyllum* (×ca. 1/4)

Thalictrum chionophyllum NAKAI ノ學名トガ與ヘラレタノデアツタガ、機ヲ得テコハニ次ノ様ニ記載スルコトニナツタノデアアル。

Thalictrum chionophyllum NAKAI schedl. in Herb. Imp. Univ. Tokyo. (1929). (*Euthalictrum*)

Haec species *Thalictrum Thunbergii* et *Thalictrum yesoense* affinis, sed ex priori foliis toto glaucissimis subtus distincte papillois, ex posteriori caule elatiore, foliolis majoribus supra nunquam ad nervos impresso-rugulosis, acheniis longioribus distidguenda.

Perennis ca. 0,4-1 M. altus. Caulis teres obscure angulatus glaber fistulosus. Folia sparsa petiolata; caulina mediana ambitu deltoidea vel ovato-deltoidea 12-27 cm. longa 12-28 cm. lata ternata, segmentis 2-sæpe 3-ternato-pinnatis, petiolo crassiusculo basi cum vaginâ margine dilute castanea scariosa caulem amplexentente 3-8 cm. longo, laminâ 2-5-plo brevior erectiusculo, petiolulis rachidibusque fere rectangulo-divaricatis. Foliola terminalia stipitata (stipite lamina brevior), 1,5-3 cm. longa 1-3,5 cm. lata ovalia vel fere orbiculariavel obovata apice 3-lobata vel 3-dentata, lobis orbicularibus vel ovato-oblongis obtusis integris vel raro 1-3-dentatis, dentibus obtusis vel acutis apice sæpe apiculatis, basi obtusissima vel late euneata vel raro aperto-cordata tota glaberrima chartacea supra plana infra glauca nervis elevato-reticulatis distincte glauco-farinosa sub microscopo dense papillosa; foliola lateralia semper minora haud vel fere stipitata, Folia superiora minora, foliolis paucioribus angustioribus apice tridentatis vel integris.

Panicula terminalis laxiflora 8-17 cm. longa ramis erecto-patentibus. Flores cernui; pedicelli filiformes 5-10 mm. longi; sepala 3-4 scariosa ochroleuca navicularia acuta 2,5-3 mm. longa; stamina 10-13 pendula sepalis superantia, antheris flavis 2-3 mm. longis, filamentis anthera æquilongis glabris filiformibus. Carpella 2-3, 1,5 mm. longa fusiformia paucivittata, stylo ca. 0,5 mm. longo.

Achænia 1-2, ca. 4 mm. longa obliquo-fusiformia apice ad stylum papillosum ca. 1 mm. longum acuminato-angustata subsessilia 6-8-sulcata glabra.

Nom. Jap. *Myôgi-karamatsu* (T. NAKAI, 1929).

Hab. Hondo: prov. Kôdzuke, Mt. Myôgi (K. HISAUCHI, Aug. 22, 1929-Typus in Herb. Imp. Univ. Tokyo.)-ibid. (K. HISAUCHI, Aug. 29, 1930)-ibid. (F. C. GRAETREX, k. 28/30-anno 1931).